

**PREPARATOMTALE  
for  
Viscotears øyegel**

**1. LEGEMIDLETS NAVN**

Viscotears 2 mg/g øyegel

**2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING**

Karbomer 2 mg/g

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

**3. LEGEMIDDELFORM**

Øyegel

**4. KLINISKE OPPLYSNINGER**

**4.1 Indikasjoner**

Nedsatt tåreproduksjon

**4.2 Dosering og administrasjonsmåte**

1 dråpe 3-4 ganger daglig eller oftere om nødvendig.

Tube holdes vertikalt og dråpen som dannes innstilles i konjunktivalsekken.

**Barn og ungdom under 18 år**

Sikkerhet og effekt av Viscotears hos barn og ungdom ved dosering som anbefalt for voksne er fastslått ved klinisk erfaring, men data fra kliniske studier er ikke tilgjengelig.

Innholdet i Viscotears øyegel er sterilt inntil tuben blir åpnet. Spissen på tuben må ikke berøre noe, inkludert øyet, da dette kan forårsake skade på øyet og kontaminere gelen.

**4.3 Kontraindikasjoner**

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

**4.4 Advarsler og forsiktighetsregler**

Kontaktlinser bør ikke brukes når øynene dryppes. Kan settes inn etter ca. 30 minutter.

**4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon**

Ingen kjente.

Ved administrering av annen lokal behandling skal Viscotears tilføres sist. Det skal gå minst 5 minutter mellom behandlingene.

**4.6 Graviditet og amming**

Kan brukes under graviditet og amming.

#### **4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner**

Om sløret syn oppstår må forsiktighet utvises ved bilkjøring og betjening av maskiner.

#### **4.8 Bivirkninger**

Følgende bivirkninger er blitt rapportert:

##### *Øyesykdommer*

Vanlige bivirkninger ( $\geq 1/100$  til  $< 1/10$ ): Kortvarig irritasjon i øyet, stikkende følelse i øyelokket, sløret syn i forbindelse med drypping.

Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelig data): Hypersensitivitet, okular hyperemi, hevelse av øyet, ødem på øyelokket, pruritus i øyet og smerter i øyet.

##### Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: [www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema).

#### **4.9 Overdosering**

Ingen kjente reaksjoner

### **5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER**

#### **5.1 Farmakodynamiske egenskaper**

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre øyemidler, ATC-kode: S01X A20

Viscotears er en stabil gel som inneholder karbomer. Viscotears er en kunstig tårevæske og inneholder ikke noe farmakologisk aktivt stoff. Etter lokal applikasjon sprer Viscotears seg raskt over konjunktiva og kornea og danner en beskyttende film med lang kontaktid. Stabil tårefilm kan bestå i opp til 6 timer.

#### **5.2 Farmakokinetiske egenskaper**

Farmakokinetiske data savnes. På grunn av karbomerens høye molekylvekt synes absorpsjon og akkumulering i øyets vev usannsynlig.

#### **5.3 Prekliniske sikkerhetsdata**

Ikke relevant

### **6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER**

#### **6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer**

Cetrimid, sorbitol, natriumhydroksid og sterilt vann.

#### **6.2 Uforlikeligheter**

Ikke relevant

#### **6.3 Holdbarhet**

Uåpnet: 3 år.

Etter åpning: 4 uker.

#### **6.4 Oppbevaringsbetingelser**

Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen.

#### **6.5 Emballasje (type og innhold)**

Plasttube 10 g og 3 x 10 g

#### **6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering**

Ikke relevant

### **7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Dr. Gerhard Mann  
Chem.-pharm Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin  
Tyskland

### **8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)**

7939

### **9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE**

01.11.94 / 07.01.99

### **10. OPPDATERINGSDATO**

01.07.2019