

## 1. LEGEMIDLETS NAVN

OxyContin 5 mg depottabletter  
OxyContin 10 mg depottabletter  
OxyContin 15 mg depottabletter  
OxyContin 20 mg depottabletter  
OxyContin 30 mg depottabletter  
OxyContin 40 mg depottabletter  
OxyContin 60 mg depottabletter  
OxyContin 80 mg depottabletter  
OxyContin 120 mg depottabletter

## 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

*5 mg*

1 depottablett inneholder 5 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 4,5 mg oksykodon.

*10 mg*

1 depottablett inneholder 10 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 9 mg oksykodon.

*15 mg*

1 depottablett inneholder 15 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 13,5 mg oksykodon.

*20 mg*

1 depottablett inneholder 20 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 17,9 mg oksykodon.

*30 mg*

1 depottablett inneholder 30 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 27 mg oksykodon.

*40 mg*

1 depottablett inneholder 40 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 35,9 mg oksykodon.

*60 mg*

1 depottablett inneholder 60 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 54 mg oksykodon.

*80 mg*

1 depottablett inneholder 80 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 72 mg oksykodon.

*120 mg*

1 depottablett inneholder 120 mg oksykodonhydroklorid, tilsvarende 108 mg oksykodon.

### Hjelpestoff(er) med kjent effekt

5 mg:

1 depottablett inneholder 77,3 mg laktosemonohydrat.

10 mg: 1 depottablett inneholder 69,3 mg laktosemonohydrat.

15 mg: 1 depottablett inneholder 103,9 mg laktosemonohydrat.

20 mg: 1 depottablett inneholder 59,3 mg laktosemonohydrat.

30 mg: 1 depottablett inneholder 88,9 mg laktosemonohydrat.

40 mg: 1 depottablett inneholder 35,3 mg laktosemonohydrat.

60 mg: 1 depottablett inneholder 58,9 mg laktosemonohydrat.

80 mg: 1 depottablett inneholder 78,5 mg laktosemonohydrat.

120 mg: 1 depottablett inneholder 117,8 mg laktosemonohydrat.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1

### 3. LEGEMIDDELFORM

Depottablett.

5 mg: Lyseblå, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «5» på den andre siden.  
10 mg: Hvit, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «10» på den andre siden.  
15 mg: Grå, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «15» på den andre siden.  
20 mg: Rosa, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «20» på den andre siden.  
30 mg: Brun, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «30» på den andre siden.  
40 mg: Gul, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «40» på den andre siden.  
60 mg: Rød, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «60» på den andre siden.  
80 mg: Grønn, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «80» på den andre siden.  
120 mg: Lilla, rund tablett merket «OC» på den ene siden og «120» på den andre siden.

### 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

#### 4.1 Indikasjon

OxyContin er indisert hos voksne og ungdom (fra 12 år og eldre) til behandling av sterke smerter som kun kan kontrolleres tilstrekkelig med opioide analgetika.

#### 4.2 Dosering og administrasjonsmåte

OxyContin bør ikke tas sammen med alkoholholdig drikke.

Dosen bør ikke gis oftere enn hver 12. time. Opioider skal dosetitreres individuelt på grunn av store forskjeller mellom ulike pasienter med hensyn til farmakokinetikk, smerteintensitet, smertegenese, eventuell toleranse og alder. Riktig dosering for hver pasient er den laveste dosen som i tilstrekkelig grad kontrollerer smertene uten betydelige bivirkninger.

Dersom en opioidformulering med umiddelbar frigjøring brukes som akuttbehandling («Rescue medication») i tillegg til depot-frigjøring, kan behovet for mer enn to episoder med akuttbehandling per dag være en indikasjon på at depotdosen krever opptitrering.

#### Voksne

Vanlig startdose for ikke tidligere opioidbehandlede pasienter:

Dosen skal tilpasses individuelt avhengig av pasientens tilstand og med hensyn til eventuell tidligere smertebehandling. Startdose for pasienter som ikke tidligere har fått opioider er 10-20 mg hver 12. time, men høyere startdose kan være nødvendig avhengig av pasientens behov for smertekontroll. Dersom smertene reagerer på opioider, kan dosen økes hver dag til nødvendig effekt er oppnådd eller uakseptable bivirkninger oppstår. Noen pasienter kan starte behandlingen med 5 mg for å begrense forekomsten av bivirkninger.

Hos pasienter som har fått oralt morfin før OxyContin-behandling, bør døgndosen baseres på følgende forhold: 10 mg oralt oksykodon tilsvarer 20 mg morfin gitt oralt. Det må påpekes at dette er en veiledning for nødvendig dosering av OxyContin. Variasjon mellom pasientene krever at doseringen titreres nøye hos den enkelte pasient til tilfredsstillende dose oppnås. Ved oppstart kan det være tilrådelig å benytte en lavere dose enn den tilsvarende dosen.

Pasienter som allerede får opioider kan, avhengig av tidligere erfaring, starte med høyere OxyContin-dose.

Man bør være spesielt oppmerksom på behandling av opioidrelaterte bivirkninger.

Behandlingen kan initieres ved å fastsette en dose oksykodon som gir smertefrihet ved å bruke enten OxyContin eller en korttidsvirkende oksykodonformulering. Deretter setter man pasienten over på samme døgndose (mg) av OxyContin. Døgndosen av OxyContin fordeles og gis hver 12. time.

Ved gjennombruddssmerter skal korttidsvirkende oksykodon (OxyNorm kapsler) anvendes ved behov, men ikke oftere enn hver 6. time, med 1/8 til 1/6 av den totale døgndosen. Dosen skal justeres etter pasientens behov.

Ved behov for doseøkning gis tilleggsdoser av korttidsvirkende oksykodon. Når smertefrihet igjen er oppnådd, beregnes den nye døgndosen (mg OxyContin + mg korttidsvirkende oksykodon) og man fortsetter med OxyContin med denne dosen (fordelt på 2 doseringer, hver 12. time).

Etter at behandlingen er initiert bør legen regelmessig kontrollere smertelindring og andre opioideffekter, slik at dosen justeres for å oppnå mest mulig effektiv smertekontroll og for å kunne behandle bivirkninger.

#### *Ved overgang mellom oral og parenteral oksykodon*

Dosen bør baseres på følgende forhold: 2 mg oral oksykodon tilsvarer 1 mg parenteral oksykodon. Det må påpekes at dette er en veiledning for dosering. Individuell variasjon mellom pasientene krever at dosen titreres nøye hos den enkelte pasient.

#### *Behandlingsvarighet*

Oksykodon skal ikke brukes lengre enn nødvendig. Se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler vedrørende behovet for tett oppfølging med hensyn på utvikling av avhengighet og misbruk.

#### *Eldre*

Forsiktighet bør utvises ved behandling med oksykodon hos eldre pasienter. Oksykodons plasmakonsentrasjon synes å være høyere hos eldre personer enn hos yngre personer. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig hos eldre pasienter.

#### *Nedsatt nyrefunksjon*

Plasmakonsentrasjonen av oksykodon er høyere hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon enn hos pasienter med normal nyrefunksjon. Innledende dosering bør følge en konservativ tilnærming hos disse pasientene. Anbefalt startdose for voksne bør reduseres med 50 % (for eksempel en total døgndose på 10 mg oralt hos pasienter som ikke tidligere har fått opioider), og hver pasient skal titreres til adekvat smertekontroll ut fra sin kliniske situasjon (se pkt. 4.4 og 5.2).

#### *Nedsatt leverfunksjon*

Plasmakonsentrasjonen av oksykodon er høyere hos pasienter med nedsatt leverfunksjon enn hos pasienter med normal leverfunksjon. Innledende dosering bør følge en konservativ tilnærming hos disse pasientene. Anbefalt startdose for voksne bør reduseres med 50 % (for eksempel en total døgndose på 10 mg oralt hos pasienter som ikke tidligere har fått opioider), og hver pasient skal titreres til adekvat smertekontroll ut fra sin kliniske situasjon (se pkt. 4.4 og 5.2).

#### *Pediatrisk populasjon*

Opioider skal kun brukes til egnete indikasjoner og forskrives av spesialist med erfaring i håndtering av sterke smerter hos barn, med nøye vurdering av fordelene og risikoene.

#### *Ungdom (fra 12 år og eldre)*

Hvis behandling med en depotformulering er nødvendig som initial behandling for opioidnaive pasienter, er den vanlige startdosen 10 mg oksykodonhydroklorid per dose med 12-timers intervaller. Enkelte pediatriske pasienter ha nytte av en startdose på 5 mg for å minimere forekomsten av bivirkninger (se andre spesielle populasjoner).

Pasienter som allerede får opioider kan starte på høyere doser, avhengig av deres tidligere erfaring med opioider.

#### *Barn under 12 år*

Sikkerhet og effekt av oksykodon hos barn under 12 år er ikke fastslått. Ingen data er tilgjengelig

## *Administrasjonsmåte*

Til oral bruk.

Tablettene skal svelges hele. Må ikke deles, tygges eller knuses. Tomme matrix (tabletskall) kan sees i avføringen.

## *Behandlingsmål og seponering*

Før oppstart av behandling med OxyContin, skal legen og pasienten bli enige om en behandlingsstrategi, inkludert behandlingsvarighet og behandlingsmål, samt en plan for å avslutte behandlingen, i samsvar med retningslinjene for smertebehandling. Under behandling skal det være hyppig kontakt mellom legen og pasienten for å vurdere behovet for videre behandling, vurdere seponering og å justere dosen om nødvendig. Når en pasient ikke lenger trenger behandling med oksykodon, kan det være tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å forebygge abstinenssymptomer. I fravær av adekvat smertekontroll skal muligheten for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom vurderes (se pkt. 4.4).

## **4.3 Kontraindikasjoner**

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Enhver situasjon der opioider er kontraindisert:

- alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom
- pulmonal hjertesykdom
- alvorlig bronkialastma
- alvorlig respirasjonsdepresjon med hypoksi og/eller hyperkapni (se pkt. 4.4)
- paralytisk ileus.

## **4.4 Advarsler og forsiktighetsregler**

### *Respirasjonsdepresjon*

Den største risikoen ved overdosering av opioider er respirasjonsdepresjon. Den respirasjonshemmende effekten til oksykodon skyldes hemming av karbondioksids stimulerende effekt på respirasjonssentrene i den forlengede marg. Denne effekten kan medføre respirasjonssvikt hos pasienter med nedsatt lungekapasitet som følge av lungesykdom eller påvirkning av andre legemidler (se også pkt. 4.5).

OxyContin 60 mg, 80 mg, 120 mg og 160 mg depottabletter skal ikke brukes hos pasienter som ikke tidligere har blitt eksponert for opioider. Depottablettenes styrke kan forårsake livstruende respirasjonssvikt hvis de blir gitt til pasienter som ikke tidligere har brukt opioider.

### *Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser*

Opioider kan forårsake søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser inkludert sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Opioidbruk øker risikoen for CSA på en doseavhengig måte. Vurder å redusere den totale opioiddosen hos pasienter med CSA.

### *Spesielle pasientgrupper*

Forsiktighet bør utvises ved behandling av svekkede eldre, pasienter med sterkt nedsatt lunge-, nyre- eller leverfunksjon, hypertyreose, hypotyreose, myksødem, Addisons sykdom, toksisk psykose, prostatahyperplasi, binyrebarkinsuffisiens, alkoholisme, delirium tremens, galleveissykdommer, pankreatitt, inflammatorisk tarmsykdom, hypotensjon, hypovolemi, hodeskader (grunnet fare for økt intrakranielt trykk) eller hos pasienter som behandles med MAO-hemmere, benzodiazepiner, andre CNS-depressiva (inkludert alkohol) eller som har blitt behandlet med MAO-hemmere de siste to ukene (se pkt. 4.5). Det kan være behov for å redusere dosen (se også pkt. 4.2).

### *Oksykodon og sedative legemidler*

Samtidig bruk av oksykodon og sedativa, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Samtidig forskrivning av sedativa bør derfor være forbeholdt pasienter der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom oksykodon blir

forskrevet samtidig med sedativa, bør laveste effektive dose benyttes, og behandlingstiden bør være kortest mulig. Pasienter skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. I den forbindelse anbefales det sterkt å gjøre pasienter og deres omsorgspersoner oppmerksomme på disse symptomene (se pkt. 4.5).

#### *Andre advarsler og forsiktighetsregler*

Oksykodons effekt kan være forsterket etter encefalitt.

Oksykodon bør ikke anvendes ved idiopatiske eller psykopatologiske smertetilstander.

Legemidlet kan hemme hosterefleksen.

Opioider, som oksykodon, kan påvirke hypotalamus-hypofyse-binyre- eller -gonadeaksene. Noen endringer som kan observeres er økning i serumprolaktin og reduksjon i plasmakortisol og testosteron. Kliniske symptomer kan oppstå som følge av disse hormonforandringene.

#### *Gastrointestinal motilitet og kirurgi*

Oksykodon øker tonus i glatt muskulatur i mage-tarm-kanalen og medfører forstoppelse ved forsinket tarmpassasje av mat (se pkt. 4.8). Ved mistanke om tarmslyng ved bruk av OxyContin, skal behandlingen straks avbrytes.

Som for alle opioidpreparater, bør oksykodonpreparater brukes med forsiktighet etter abdominal kirurgi, da det er kjent at opioider svekker tarmens motilitet. Oksykodon bør ikke brukes før legen har forsikret seg om at tarmfunksjonen er normal.

OxyContin anbefales ikke til preoperativ bruk eller postoperativt de første 12-24 timene.

Oppstartstidspunkt for den postoperative behandlingen med OxyContin må vurderes for hver enkelt pasient ut fra type og omfang av operasjon, anestesimetode, samtidig bruk av andre legemidler og pasientens tilstand.

Økt tonus i glatt muskulatur øker også trykket i galle- og urinveier, og oksykodon er derfor mindre egnet ved galle- eller urinveisspasmer.

#### *Problematiske opioidbruk (misbruk og avhengighet)*

Toleranse og fysisk og/eller psykologisk avhengighet kan bli utviklet ved gjentatt administrering av opioider, f.eks. oksykodon.

Gjentatt bruk av OxyContin kan føre til problematisk opioidbruk. En høyere dose og lengre varighet av opioidbehandling kan øke risikoen for å utvikle problematisk opioidbruk. Misbruk eller villet misbruk av OxyContin kan føre til overdose og/eller død. Risikoen for å utvikle problematisk opioidbruk har økt for pasienter med problematisk opioidbruk personlig eller i familien (foreldre eller søsken) (inkludert problematisk alkoholbruk), hos personer som røyker, eller hos pasienter med tidligere psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser).

Før oppstart av behandling med OxyContin og under behandlingen skal man bli enig med pasienten om behandlingsmål og en seponeringsplan (se pkt. 4.2). Før og under behandlingen skal pasienten også få informasjon om risikoene og tegnene på problematisk opioidbruk. Dersom disse tegnene oppstår skal pasientene rådes til å kontakte legen.

Pasienter bør følges opp hvis de får en legemiddeloppsøkende atferd (f.eks. ber om ny resept for tidlig). Dette omfatter gjennomgang ved samtidig bruk av opioider og psykoaktive stoffer (som benzodiazepiner). Det bør vurderes å konsultere en spesialist i avhengighetsmedisin dersom pasienter har tegn og symptomer på problematisk opioidbruk.

#### *Sykdommer i lever og galleveier*

Oksykodon kan forårsake dysfunksjon og spasmer i Oddis sfinkter, og dermed øke risikoen for galleveissymptomer og pankreatitt. Derfor må oksykodon administreres med forsiktighet hos pasienter med pankreatitt og sykdommer i galleveiene.

### *Seponering/Abstinens*

Abstinenssyndrom kan oppstå ved brå seponering av behandling. Når en pasient ikke lenger har behov for behandling med oksykodon, anbefales gradvis nedtrapping av dosen for å unngå abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan omfatte gjesping, mydriasis, lakrimasjon, rhinoré, tremor, hyperhidrose, angst, uro, kramper og insomni.

Plutselig behandlingsavbrudd kan innen 24 timer gi opphav til følgende abstinenssymptomer: rastløshet, lakrimasjon, rhinoré, svetting og urolig søvn. Disse symptomene kan forsterkes de tre påfølgende dagene.

### *Toleranse*

Som med alle opioider kan pasienten utvikle toleranse overfor legemidlet ved kronisk bruk og ha behov for gradvis høyere doser for å opprettholde smertekontroll.

Hyperalgesi som ikke responderer på ytterligere doseøkning av oksykodon kan forekomme, spesielt ved høye doser. Det kan være nødvendig å redusere dosen med oksykodon eller bytte til et annet opioid.

### *Parenteralt misbruk av orale legemiddelformer*

Misbruk av orale legemiddelformer ved parenteral administrering kan forventes å medføre alvorlige bivirkninger som kan være livstruende (se pkt. 4.9).

### *Alkohol*

Samtidig bruk av alkohol og OxyContin kan gi økt risiko for bivirkninger av oksykodon. Samtidig bruk skal unngås (se pkt. 4.5).

### *Administrasjonsmåte*

Tablettene skal svelges hele. Må ikke deles, tygges eller knuses. Delte, tygde eller knuste tabletter fører til rask frisetting av oksykodon, som kan forårsake absorpsjon av en livstruende mengde (se pkt. 4.2 og 4.9).

### *Antidoping advarsel*

Idrettsutøvere skal være oppmerksomme på at dette legemidlet kan gi positivt resultat i antidopingtester. Bruk av oksykodonhydroklorid som dopingmiddel kan utgjøre en helserisiko.

### *Hjelpestoffer*

Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

## **4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon**

Samtidig bruk av oksykodon med sedativa, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall på grunn av additiv CNS-hemmende effekt. Dose og varighet ved samtidig bruk bør begrenses (se pkt. 4.4). Legemidler som hemmer CNS inkluderer, men er ikke begrenset til: andre opioider, gabapentioner som pregabalin, anxiolytika, hypnotika og sedativa (inkludert benzodiazepiner), antipsykotika, antidepressiva, fenotiaziner og alkohol.

Antikolinergika (f.eks. trisykliske antidepressiva, antipsykotika, antihistaminer, parkinsonmidler og muskelrelaksantia) kan forsterke oksykodons antikolinerge bivirkninger (som forstoppelse, munntørrehet og vannlatingsforstyrrelser).

Samtidig bruk av oksykodon og serotonerge legemidler, som en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) eller en serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer (SNRI), kan forårsake serotoninintoksitasitet. Symptomene på serotoninintoksitasitet kan omfatte endringer i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonome forstyrrelser (f.eks. takykardi, ustabilt blodtrykk, hypertermi),

nevromuskulære avvik (f.eks. hyperrefleksi, koordinasjonsproblemer, stivhet) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré). Oksykodon skal brukes med forsiktighet hos pasienter som bruker disse legemidlene. Hos enkelte pasienter kan det være behov for dosereduksjon.

Det er kjent at MAO-hemmere interagerer med narkotiske analgetika. De gir CNS-stimulering eller -hemming med hyper- eller hypotensiv krise (se pkt. 4.4). OxyContin bør anvendes med spesiell forsiktighet hos pasienter som samtidig får MAO-hemmere eller som har fått MAO-hemmere de siste to ukene (se pkt. 4.4).

Oksykodon metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4 med bidrag fra CYP2D6. Aktiviteten til disse enzymene kan hemmes eller induseres av forskjellige legemidler og kosttilskudd som inntas samtidig, noe som kan medføre endret plasmakonsentrasjon av oksykodon. Det kan derfor være nødvendig å justere oksykodondosen.

CYP3A4-hemmere, som makrolidantibiotika (f.eks. klaritromycin, erytromycin og telitromycin), antimykotika av azoltypen (f.eks. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol og posakonazol), proteasehemmere (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir og sakinavir), cimetidin og grapefruktjuice kan gi redusert clearance av oksykodon og medføre økt plasmakonsentrasjon av oksykodon. Reduksjon av oksykodondosen og retitrering kan derfor være nødvendig.

Eksempler:

- Etter fem dagers oral administrering av 200 mg itrakonazol, en potent CYP3A4-hemmer, én gang daglig, økte AUC for oralt oksykodon. Gjennomsnittlig AUC var ca. 2,4 ganger høyere, i området 1,5-3,4.
- Etter fire dagers oral administrering av 200 mg vorikonazol, en CYP3A4-hemmer, to ganger daglig (første dag 2 x 400 mg), økte AUC for oralt oksykodon. Gjennomsnittlig AUC var ca. 3,6 ganger høyere, i området 2,7-5,6.
- Etter fire dagers oral administrering av 800 mg telitromycin, en CYP3A4-hemmer, én gang daglig, økte AUC for oralt oksykodon. Gjennomsnittlig AUC var ca. 1,8 ganger høyere, i området 1,3-2,3.
- Etter fem dagers oral administrering av 200 ml grapefruktjuice, en CYP3A4-hemmer, tre ganger daglig, økte AUC for oralt oksykodon. Gjennomsnittlig AUC var ca. 1,7 ganger høyere, i området 1,1-2,1.

CYP3A4-induktorer, som rifampicin, karbamazepin, fenytoin og johannesurt, kan indusere oksykodons metabolisme og gi økt clearance av legemidlet, noe som medfører redusert plasmakonsentrasjon av oksykodon. Forsiktighet anbefales derfor, og ytterligere titrering kan være nødvendig for å oppnå smertekontroll.

Eksempler:

- Johannesurt, en CYP3A4-induktor, gitt som 300 mg tre ganger daglig i femten dager, reduserte AUC for oralt oksykodon. I gjennomsnitt var AUC ca. 50 % lavere (spredning 37-57 %).
- Rifampicin, en CYP3A4-induktor, gitt som 600 mg én gang daglig i syv dager, reduserte AUC for oralt oksykodon. I gjennomsnitt var AUC ca. 86 % lavere.

Legemidler som hemmer CYP2D6-aktivitet, som paroksetin, fluoksetin og kinidin, kan gi redusert clearance av oksykodon og medføre økt plasmakonsentrasjon av oksykodon. Samtidig bruk av CYP2D6-hemmere har imidlertid kun medført ubetydelig påvirkning av oksykodons eliminasjon og ingen påvirkning av oksykodons farmakodynamiske effekter.

Klinisk relevante endringer i INR (International Normalized Ratio) i begge retninger er sett hos

individer som har fått kumarinantikoagulantia samtidig med OxyContin.

#### 4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Bruk av dette legemidlet bør i størst mulig grad unngås hos pasienter som er gravide eller ammer.

##### *Graviditet*

Erfaring med behandling under graviditet mangler. Dyrestudier har ikke vist relevante reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3). Langvarig bruk av oksykodon under graviditet kan gi abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet. Administrering av oksykodon like før fødselen kan gi respirasjonsdepresjon hos det nyfødte barnet. Under graviditet skal oksykodon kun gis på indikasjon, og der morens behov veies opp mot risikoen for barnet. På grunn av risiko for respirasjonsdepresjon og/eller abstinenssymptomer, bør nyfødte barn av mødre som har vært behandlet med oksykodon under svangerskapets siste 3 til 4 uker overvåkes nøye.

##### *Amming*

Oksykodon går over i morsmelk og kan forårsake respirasjonsdepresjon hos barn som ammes. Konsentrasjonsforholdet mellom melk og plasma var 3,4:1. OxyContin bør derfor ikke brukes av mødre som ammer.

##### *Fertilitet*

Det er ingen tilgjengelige data fra mennesker. Oksykodon har ikke vist effekt på fertilitet hos rotter (se pkt. 5.3).

#### 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Behandling med oksykodon kan svekke reaksjonsevnen. Sedasjon er en vanlig bivirkning. For opioider gjelder generelt at reaksjonsevnen svekkes, spesielt i begynnelsen av behandlingen og ved doseøkning, og dermed svekkes også evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Dette bør tas hensyn til når det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring og bruk av maskiner.

#### 4.8 Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er forstoppelse og kvalme, som begge forekommer hos 25-30 % av pasientene ved oral administrering. Kvalme eller oppkast er vanligvis forbigående, men kan lindres med antiemetika. Som med andre sterke opioider kan forstoppelse forekomme og bør behandles på egnet måte med laksantia. Dersom de opioidrelaterte bivirkningene fortsetter bør de utredes med hensyn til alternative årsaker.

Med unntak av forstoppelse bruker bivirkningene av rene opioidagonister å avta ved fortsatt behandling.

Den mest alvorlige bivirkningen er, som for andre opioider respirasjonsdepresjon (se også pkt. 4.4 og 4.9). Respirasjonsdepresjon forekommer vanligvis hos eldre, svake eller pasienter som ikke har utviklet toleranse.

Følgende frekvenskategorier danner grunnlaget for klassifisering av bivirkningene:

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Svært vanlige  | $\geq 1/10$                                |
| Vanlige        | $\geq 1/100$ til $< 1/10$                  |
| Mindre vanlige | $\geq 1/1000$ til $< 1/100$                |
| Sjeldne        | $\geq 1/10\ 000$ til $< 1/1000$            |
| Svært sjeldne  | $< 1/10\ 000$                              |
| Ikke kjent     | Kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data |

Følgende bivirkninger kan forekomme:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Forstyrrelser i immunsystemet</b> |
|--------------------------------------|



|                                                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindre vanlige                                                | Overfølsomhet                                                                                                                |
| Ikke kjent                                                    | Anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon                                                                                 |
| <b>Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer</b>           |                                                                                                                              |
| Vanlige                                                       | Redusert appetitt                                                                                                            |
| Mindre vanlige                                                | Dehydrering                                                                                                                  |
| <b>Psykiatriske lidelser</b>                                  |                                                                                                                              |
| Vanlige                                                       | Angst, depresjon, insomni, nervøsitet, endring i kognitiv ytelse (inkludert unormale tanker, forvirring)                     |
| Mindre vanlige                                                | Agitasjon, affektlabilitet, eufori, hallusinasjoner, redusert libido, legemiddelavhengighet (se pkt. 4.4)                    |
| Ikke kjent                                                    | Aggresjon                                                                                                                    |
| <b>Nevrologiske sykdommer</b>                                 |                                                                                                                              |
| Svært vanlige                                                 | Somnolens, svimmelhet, hodepine                                                                                              |
| Vanlige                                                       | Tremor, letargi                                                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Amnesi, krampeanfall, hypertoni, hypoestesi, ufrivillig muskelkontraksjoner, taleforstyrrelser, synkope, parestesi, dysgeusi |
| Ikke kjent                                                    | Hyperalgesi, søvnapné syndrom                                                                                                |
| <b>Øyesykdommer</b>                                           |                                                                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Synssvekkelse, miose                                                                                                         |
| <b>Sykdommer i øre og labyrint</b>                            |                                                                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Vertigo                                                                                                                      |
| <b>Hjertesykdommer</b>                                        |                                                                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Palpitasjoner (i forbindelse med abstinenssyndrom)                                                                           |
| <b>Karsykdommer</b>                                           |                                                                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Vasodilatasjon                                                                                                               |
| Sjeldne                                                       | Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon                                                                                         |
| <b>Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum</b> |                                                                                                                              |
| Vanlige                                                       | Dyspné                                                                                                                       |
| Mindre vanlige                                                | Respirasjonsdepresjon                                                                                                        |
| Ikke kjent                                                    | Sentralt søvnapné syndrom                                                                                                    |
| <b>Gastrointestinale sykdommer</b>                            |                                                                                                                              |
| Svært vanlige                                                 | Forstoppelse, kvalme, oppkast                                                                                                |
| Vanlige                                                       | Abdominalsmerter, diaré, munntørrehet, dyspepsi                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Dysfagi, flatulens, sure oppstøt, ileus                                                                                      |
| Ikke kjent                                                    | Karies                                                                                                                       |
| <b>Sykdommer i lever og galleveier</b>                        |                                                                                                                              |
| Mindre vanlige                                                | Økte leverenzymmer                                                                                                           |
| Ikke kjent                                                    | Kolestase, galleveiskolikk, dysfunksjon i Oddis sfinkter                                                                     |
| <b>Hud- og underhudssykdommer</b>                             |                                                                                                                              |
| Svært vanlige                                                 | Kløe                                                                                                                         |
| Vanlige                                                       | Utslett, hyperhidrose                                                                                                        |
| Mindre vanlige                                                | Tørr hud                                                                                                                     |
| Sjeldne                                                       | Urticaria                                                                                                                    |
| <b>Sykdommer i nyre og urinveier</b>                          |                                                                                                                              |

|                                                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindre vanlige                                                   | Urinretensjon                                                                             |
| <b>Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer</b>                |                                                                                           |
| Mindre vanlige                                                   | Erekttil dysfunksjon, hypogonadisme                                                       |
| Ikke kjent                                                       | Amenoré                                                                                   |
| <b>Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet</b> |                                                                                           |
| Vanlige                                                          | Asteni, fatigue                                                                           |
| Mindre vanlige                                                   | Frysninger, seponeringssyndrom, malaise, ødem, perifert ødem, legemiddeltoleranse, tørste |
| Ikke kjent                                                       | Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom                                                    |

#### Legemiddelavhengighet

Gjentatt bruk av OxyContin kan føre til legemiddelavhengighet, også ved terapeutiske doser. Risikoen for legemiddelavhengighet kan variere avhengig av pasientens individuelle risikofaktorer, dosering og opioidbehandlingens varighet (se pkt. 4.4).

#### Pediatrisk populasjon

Frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger hos ungdommer (12 til 18 år) ser ut til å være tilsvarende som hos voksne (se pkt 5.1).

#### Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: [www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema).

## **4.9 Overdosering**

#### *Symptomer på overdosering*

Tegn på overdosering er knappenålsstore pupiller (miose), respirasjonsdepresjon, søvnighet, slapphet i skjelettmuskulaturen, bradykardi, hypotensjon og lungeødem. Stupor eller koma og død kan inntreffe i alvorlige tilfeller.

Toksisk leukoencefalopati har vært observert ved overdose av oksykodon.

#### *Behandling av overdosering*

Det viktigste er å sikre åpne luftveier og iverksette assistert eller kontrollert ventilasjon. Oppretthold og støtt åndedrett og sirkulasjon. Om nødvendig ventrikkeltømming, medisinsk kull, laksantia.

Nalokson kan gis intravenøst som motgift ved overdose. Dosen tilpasses ut fra alvorlighet og respons (vanligvis 0,4 mg i.v. til voksne, barn 0,01 mg/kg i.v.).

Infusjonen bør fortsette i en takt som tilsvarer tidligere bolusdoser og være i samsvar med pasientens respons. Da nalokson har relativt kort virketid må pasienten overvåkes nøye i forhold til at spontan respirasjon er kommet i gang på en pålitelig måte. Overvåking i ytterligere 24-48 timer anbefales ved risiko for tilbakefall av symptomer.

Depottabletter fortsetter å frisette oksykodon i opptil 12 timer etter administrering, og håndteringen av overdosering med oksykodon må derfor tilpasses. Det kan være nødvendig å tømme mageinnholdet, siden dette kan bidra til å fjerne uabsorbert legemiddel, spesielt etter inntak av et depotpreparat.

Nalokson bør ikke gis dersom det ikke foreligger klinisk signifikant respirasjonsdepresjon eller sirkulasjonshemming som følge av overdosering med oksykodon.

Nalokson bør gis med forsiktighet til personer med kjent eller mistenkt avhengighet av oksykodon. Plutselig eller fullstendig reversering av opioideffektene kan i slike tilfeller fremskynde smerter samt akutt abstinenssyndrom.

### *Toksisitet*

Dødelig dose for voksne (uten toleranseutvikling) angis til ca. 60-100 mg oralt. Samtidig inntak av rusmidler/legemidler (f.eks. alkohol eller benzodiazepiner) forsterker den toksiske effekten.

## **5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER**

### **5.1 Farmakodynamiske egenskaper**

Farmakoterapeutisk gruppe: Opiumsalkaloider, ATC-kode: N02A A05

Oksykodon er et opioidanalgetikum med kraftig analgetisk effekt. Oksykodon er en ren opioidagonist uten antagonistisk effekt og med morfinlignende virkning. Dets viktigste effekt synes å finne sted via  $\mu$ -opioidreseptorer, men affinitet til delta- eller kappa-opioidreseptorer er også påvist. Oralt oksykodon er ekvipotent med oralt morfin i forholdet 1:2. Den analgetiske effekten skyldes delvis endret smerteopplevelse og delvis økning av smerteterskelen. Oksykodon utøver sin analgetiske effekt på forskjellige nivåer i CNS.

Oksykodon hemmer karbondioksids stimulerende effekt på respirasjonssenteret i den forlengede marg (medulla oblongata) og kan forårsake respirasjonsdepresjon.

Oksykodon stimulerer dopaminreseptorer. Stimulering av dopaminreseptorer i "kjemoreseptor triggeren" i den forlengede marg, kan utløse kvalme og oppkast (se pkt. 4.8).

#### *Det endokrine systemet*

Se pkt. 4.4.

#### *Det gastrointestinale systemet*

Opioider kan indusere spasmer i Oddis sfinkter.

#### *Andre farmakologiske effekter*

*In vitro* og dyrestudier viser at naturlige opioider, som f.eks. morfin, har ulike effekter på deler av immunsystemet. Klinisk relevans av disse funnene er ikke påvist. Det er ukjent om oksykodon, som er et semisyntetisk opioid, har tilsvarende immunologisk effekt som morfin.

#### Pediatrik populasjon

Samlet sett viser sikkerhetsdata av oksykodon i kliniske, farmakodynamiske og farmakokinetiske studier at oksykodon generelt tolereres godt hos pediatriske pasienter med bivirkninger som hovedsakelig påvirker mage-tarm og nervesystemet. Bivirkninger var i samsvar med den kjente sikkerhetsprofilen til oksykodon samt andre sammenlignbare sterke opioider (se pkt. 4.8 Bivirkninger).

Det finnes ingen data fra kliniske studier om langtidsbruk hos barn i alderen 12 til 18 år.

### **5.2 Farmakokinetiske egenskaper**

En sammenheng mellom dose og plasmakonsentrasjon av oksykodon, samt mellom konsentrasjon og visse forventede opioideffekter er påvist.

#### *Absorpsjon*

OxyContin inneholder oksykodon som frisettes langsomt, noe som gir en langsom absorpsjon. Tabletten med kontrollert frisetting har et tofasert absorpsjonsmønster med tilsynelatende absorpsjonshalveringstider på 0,6 og 6,2 timer. Maksimal analgetisk effekt oppnås etter 3 timer og effekten varer i ca. 12 timer.

Oppløsning *in vitro* er uavhengig av pH.

Matinntak har ingen eller svært liten effekt på absorpsjonen av depottablettene.

Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er anslått til ca. 50 %.

#### *Distribusjon*

Etter absorpsjon fordeles virkestoffet i hele kroppen. Omkring 45 % bindes til plasmaprotein, og distribusjonsvolum ved steady state er 2,6 l/kg.

#### *Biotransformasjon*

Oksykodon metaboliseres i tarm og lever via CYP3A4 og CYP2D6 til noroksykodon, oksymorfon og noroksymorfon, som deretter glukuronideres. Noroksykodon og noroksymorfon er hovedmetabolittene i sirkulasjonen. Noroksykodon er en svak  $\mu$ -opioidagonist. Noroksymorfon er en potent  $\mu$ -opioidagonist, men passerer ikke blod-hjernebarrieren i signifikant grad. Oksymorfon er en potent  $\mu$ -opioidagonist, men foreligger i svært lav konsentrasjon etter administrering av oksykodon. Metabolittenes analgetiske effekt anses ikke å være klinisk relevant.

Clearance er 0,8 l/min og halveringstiden for OxyContin er ca. 4,5 timer.

#### *Eliminasjon*

Både aktivt legemiddel og dets metabolitter utskilles i urin og feces.

I urin utskilles  $45 \pm 21$  % som N-demetylerede metabolitter (bl.a. noroksykodon og noroksymorfon) og  $11 \pm 6$  % av dosen som O-demetylerede metabolitter (bl.a. oksymorfon).

#### *Spesielle pasientpopulasjoner*

Oksykodons plasmakonsentrasjon påvirkes kun nominelt av alder og er 15 % høyere hos eldre sammenlignet med yngre pasienter.

Kvinnelige pasienter har i gjennomsnitt opptil 25 % høyere plasmakonsentrasjon av oksykodon enn menn basert på kroppsvekt.

Pasienter med lett, moderat og sterkt nedsatt leverfunksjon viste henholdsvis 1,2, 2,0 og 1,9 ganger økning i plasmakonsentrasjonen sammenlignet med pasienter med normal leverfunksjon. AUC-verdier økte i gjennomsnitt henholdsvis 1,4, 3,2 og 3,2 ganger sammenlignet med pasienter med normal leverfunksjon. Eliminasjonshalveringstiden for oksykodon økte henholdsvis 1,1, 1,8 og 1,8 ganger sammenlignet med pasienter med normal leverfunksjon.

Pasienter med lett, moderat og sterkt nedsatt nyrefunksjon viste henholdsvis 1,1, 1,4 og 1,7 ganger økning i plasmakonsentrasjonen sammenlignet med pasienter med normal nyrefunksjon. AUC-verdier økte i gjennomsnitt henholdsvis 1,5, 1,7 og 2,3 ganger sammenlignet med pasienter med normal nyrefunksjon. Eliminasjonshalveringstiden for oksykodon økte henholdsvis 1,5, 1,2 og 1,4 ganger sammenlignet med pasienter med normal nyrefunksjon.

### **5.3 Prekliniske sikkerhetsdata**

#### *Reproduksjonstoksisitet*

Oksykodon hadde ingen effekt på fertilitet og tidlig embryoutvikling hos hann- og hunnrotter ved doser opptil 8 mg/kg kroppsvekt, og forårsaket ingen misdannelser hos rotter ved doser opptil 8 mg/kg eller hos kaniner ved doser opptil 125 mg/kg kroppsvekt. Da individuelle fostre ble benyttet i statistisk evaluering av kaniner, ble det imidlertid observert en doserelatert økning i utviklingsavvik (økt forekomst av 27 presakrale ryggvirvler, og ekstra par ribben). Når disse parameterne ble statistisk evaluert med hensyn til kull, var kun forekomsten av 27 presakrale ryggvirvler økt og kun i 125 mg/kg gruppen, et dosenivå som ga alvorlige farmakotoksiske effekter hos de drektige dyrene.

I en studie av pre- og postnatal utvikling hos rotter, ble det sett redusert kroppsvekt hos rotteungene ved 6 mg/kg/dag, ved doser som reduserte maternell vekt og næringsinntak (NOAEL 2 mg/kg kroppsvekt). Der var ingen effekter på fysiske, reflektoriske, eller sensoriske utviklingsparametere, eller på atferds- eller reproduksjonsindikatorer.

### *Gentoksisitet/karsinogenese*

Som for andre opioider var også oksykodon gentoksisk i enkelte *in vitro*-analyser (f.eks. muselymfomtest). Det ble ikke sett gentoksiske effekter i bakteriell mutasjonstest (Ames test) eller i mikronukleus test hos mus.

Det er ikke utført langtidsstudier med hensyn til karsinogenitet.

## **6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER**

### **6.1 Hjelpestoffer**

Laktosemonohydrat  
Magnesiumstearat  
Ammoniummetakrylatkopolymer  
Povidon  
Stearylalkohol  
Talkum  
Triacetin  
Sorbinsyre

### *Filmdrasjering*

Hypromellose  
Makrogol  
Hydroksypropylcellulose (5 mg, 10 mg og 80 mg depottabletter)  
Polysorbat 80 (20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg og 120 mg depottabletter)

### *Fargestoffer*

Indigokarmin (E132) (80 mg depottabletter)  
Titandioksid (E171)  
Jernoksid (E172) (15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg depottabletter)  
Briljantblå (E133) (5 mg depottabletter)

### **6.2 Uforlikeligheter**

Ikke relevant.

### **6.3 Holdbarhet**

3 år.

### **6.4 Oppbevaringsbetingelser**

5 mg

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

### **6.5 Emballasje (type og innhold)**

PVC/Aluminium blisterpakning.  
HD-polyetylenboks med polypropylenlokk.  
Polypropylenboks med polyetylenlokk.

*Depottabletter 5 mg*

28 eller 98 stk. (blisterpakning)

*Depottabletter 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg*  
25, 28, 50, 98 eller 100 stk. (blisterpakning og boks)

*Depottabletter 15 mg, 30 mg*  
28, 56 eller 98 stk. (blisterpakning)

*Depottabletter 60 mg, 120 mg*  
14, 28, 56, 98 eller 112 stk. (blisterpakning)

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

## **6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering**

Ingen spesielle forholdsregler.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

## **7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Mundipharma AS  
Lysaker torg 5  
1366 Lysaker

## **8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)**

|         |         |
|---------|---------|
| 5 mg:   | 02-1153 |
| 10 mg:  | 94-2768 |
| 15 mg:  | 07-4847 |
| 20 mg:  | 94-2769 |
| 30 mg:  | 07-4848 |
| 40 mg:  | 94-2770 |
| 60 mg:  | 07-5180 |
| 80 mg:  | 01-2425 |
| 120 mg: | 07-5181 |

## **9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 5 mg:   | 26.06.2003 / 26.12.2007 |
| 10 mg:  | 31.10.2000 / 14.04.2010 |
| 15 mg:  | 10.06.2011 / 16.04.2015 |
| 20 mg:  | 31.10.2000 / 14.04.2010 |
| 30 mg:  | 10.06.2011 / 16.04.2015 |
| 40 mg:  | 31.10.2000 / 14.04.2010 |
| 60 mg:  | 10.06.2011 / 16.04.2015 |
| 80 mg:  | 29.08.2001 / 14.04.2010 |
| 120 mg: | 10.06.2011 / 16.04.2015 |

## **10. OPPDATERINGSDATO**

25.02.2025