

PREPARATOMTALE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Physioneal 40 Glucose peritonealdialysevæske 13,6 mg/ml i tokammerpose A+B

Physioneal 40 Glucose peritonealdialysevæske 22,7 mg/ml i tokammerpose A+B

Physioneal 40 Glucose peritonealdialysevæske 38,6 mg/ml i tokammerpose A+B

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Før blanding

1000 ml elektrolyttoppløsning (Lite kammer "A") inneholder:	13,6 mg/ml	22,7 mg/ml	38,6 mg/ml
---	------------	------------	------------

Aktive substanser:

Glukosemonohydrat	41,25 g	68,85 g	117,14 g
ekvivalent til Glukose, vannfri	37,50 g	62,60 g	106,5 g
Kalsiumkloriddihydrat	0,507 g	0,507 g	0,507g
Magnesiumkloridheksahydrat	0,140 g	0,140 g	0,140 g

1000 ml bufferoppløsning (Stort kammer "B") inneholder:	13,6 mg/ml	22,7 mg/ml	38,6 mg/ml
---	------------	------------	------------

Aktive substanser:

Natriumklorid	8,43 g	8,43 g	8,43 g
Natriumhydrogenkarbonat	3,29 g	3,29 g	3,29 g
Natrium (S)-laktat oppløsning	2,63 g	2,63 g	2,63 g

Etter blanding

1000 ml ferdigblandet oppløsning inneholder:	13,6 mg/ml	22,7 mg/ml	38,6 mg/ml
--	------------	------------	------------

Aktive substanser:

Glukosemonohydrat	15,0 g	25,0 g	42,5 g
ekvivalent til Glukose, vannfri	13,6 g	22,7 g	38,6 g
Natriumklorid	5,38 g	5,38 g	5,38 g
Kalsiumkloriddihydrat	0,184 g	0,184 g	0,184g
Magnesiumkloridheksahydrat	0,051 g	0,051 g	0,051 g
Natriumhydrogenkarbonat	2,10 g	2,10 g	2,10 g
Natrium (S)-laktat oppløsning	1,68 g	1,68 g	1,68 g

1000 ml ferdig oppløsning etter blanding tilsvarer 362,5 ml av oppløsning A og 637,5 ml av oppløsning B.

Sammensetning i mmol/l i den endelige oppløsningen etter blanding:

	13,6 mg/ml	22,7 mg/ml	38,6 mg/ml
Glukose, vannfri (C ₆ H ₁₂ O ₆)	75,5 mmol/l	126 mmol/l	214 mmol/l
Na ⁺	132 mmol/l	132 mmol/l	132 mmol/l
Ca ⁺⁺	1,25 mmol/l	1,25 mmol/l	1,25 mmol/l
Mg ⁺⁺	0,25 mmol/l	0,25 mmol/l	0,25 mmol/l
Cl ⁻	95 mmol/l	95 mmol/l	95 mmol/l
HCO ₃ ⁻	25 mmol/l	25 mmol/l	25 mmol/l
C ₃ H ₅ O ₃ ⁻	15 mmol/l	15 mmol/l	15 mmol/l

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1

Betegnelsen '40' i navnet spesifiserer bufferkonsentrasjonen i oppløsningen (15 mmol/l laktat + 25 mmol/l hydrogenkarbonat = 40 mmol/l).

3. LEGEMIDDELFORM

Peritonealdialysevæske

Steril, klar, fargeløs oppløsning

pH i den endelige oppløsningen er 7,4.

Osmolaritet: 344 mOsmol/l (13,6 mg/ml)

395 mOsmol/l (22,7 mg/ml)

483 mOsmol/l (38,6 mg/ml)

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Physioneal 40 er indisert ved peritonealdialyse, inkludert:

- Akutt og kronisk nyresvikt
- Alvorlig væskeretensjon
- Alvorlig elektrolyttforstyrrelse
- Intoksikasjoner med dialyserbare substanser, når et mer adekvat behandlingsalternativ ikke er tilgjengelig.

Physioneal 40 peritonealdialysevæsker basert på hydrogenkarbonat/laktat med en fysiologisk pH er spesielt indisert hos pasienter som får abdominale smerter ved fylling av væske eller ubehag av væsker som kun er basert på laktatbuffer med en lav pH.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Behandlingsmåten, behandlingshyppigheten, volumet som skal skiftes, dialyseintervall og lengde på dialysetiden skal bestemmes av legen.

For å unngå risikoen for alvorlig dehydrering, hypovolemi og for å redusere proteintapet, er det tilrådelig å velge peritonealdialysevæsken med den laveste osmolariteten i samsvar med kravene til væsken som skal fjernes ved hvert skift.

- Voksne: Pasienter på kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse (CAPD) utfører vanligvis 4 skift per dag (24 timer). Pasienter på automatisert peritonealdialyse (APD) utfører vanligvis 4-5 skift om natten og inntil 2 skift i løpet av dagtiden. Fyllvolumet er avhengig av kroppsstørrelse, vanligvis fra 2,0 til 2,5 liter.
- Eldre: som for voksne
- Pediatrisk populasjon
Sikkerhet og effekt av Physioneal 40 hos pediatriske pasienter er ikke fastslått. De kliniske fordelene med Physioneal 40 skal derfor veies opp mot risikoen for bivirkninger for denne pasientgruppen.
For pediatriske pasienter >2 år, har det blitt anbefalt 800 til 1400 ml/m² per skift, opp til et maksimalt volum på 2000 ml, etter hva som tolereres. For barn under 2 år anbefales fyllvolum på 200 til 1000 ml/m².

Administrasjonsmåte

Forsiktighetsregler som skal følges før håndtering eller bruk av legemidlet

- Physioneal 40 er kun ment for intraperitoneal administrasjon. Ikke til intravenøs administrasjon.
- Peritonealdialysevæsker kan varmes til 37 °C for å øke pasientkomforten. Det skal imidlertid kun brukes tørr varme (f.eks. varmebag, varmeplate). Dialysevæsker skal ikke varmes i vann eller i en mikrobølgeovn på grunn av potensiell pasientskade eller ubehag.
- Aseptisk teknikk må benyttes gjennom hele prosedyren for peritonealdialyse.
- Ikke bruk dialysevæsken dersom den er misfarget, uklar, inneholder partikler, viser tegn til lekkasje mellom kamrene eller på utsiden, eller hvis forseglingsene ikke er intakte.
- Den avtappede væsken bør observeres med hensyn til forekomst av fibrin eller uklarhet, ettersom dette kan være tegn på peritonitt.
- Kun til engangsbruk.
- Etter at ytterposen er fjernet, bryt straks forseglingen (brekkstiften) mellom kamrene for å blande de to væskene. Vent inntil det øvre kammeret er tømt fullstendig i det nedre kammeret. Bland forsiktig ved å trykke med begge hender på det nedre kammerets vegger. Oppløsningen til intraperitoneal bruk må infunderes innen 24 timer etter blanding.
- For bruksanvisning om bruk av legemidlet, se pkt. 6.6; Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffene eller overfor noen av innholdsstoffene angitt i pkt. 6.1.

Physioneal 40 skal ikke brukes til pasienter med:

- mekaniske defekter som ikke kan korrigeres og som hindrer effektiv PD eller øker risikoen for infeksjon.
- dokumentert tap av peritonealfunksjonen eller omfattende adhesjoner som nedsetter peritonealfunksjonen.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Bruk hos pasienter som krever forsiktighet ved bruk

Peritonealdialyse skal utføres med forsiktighet hos pasienter som har:

- 1) tilstander i abdomen, inkludert skade på peritonealmembranen og diafragma etter kirurgi, fra medfødte anomali eller skade inntil fullstendig tilhelning, abdominale tumorer, infeksjon i bukveggen, brokk, fekal fistel, kolostomi eller ilioستي, hyppige episoder av divertikulitt, inflammatorisk eller iskemisk tarmsykdom, store polycystiske nyrer eller andre tilstander som påvirker integriteten til bukveggen, overflaten på abdomen eller bukhulen.
- 2) andre tilstander, inkludert nylig gjennomført aortagraft og alvorlig lungesykdom.

Innkapslende peritoneal sklerose (EPS)

Innkapslende peritoneal sklerose (Encapsulating peritoneal sclerosis (EPS)) anses å være en kjent, sjelden komplikasjon ved peritonealdialysebehandling. EPS er rapportert hos pasienter som bruker peritonealdialysevæsker, inkludert noen pasienter som bruker Physioneal 40 som en del av sin PD-behandling.

Peritonitt

Dersom peritonitt oppstår skal valg av antibiotika samt doseringen, hvis mulig, baseres på resultater av identifiserings- og følsomhetstester av isolert(e) organisme(r). Bredspektret antibiotika kan være indisert før identifisering av involvert(e) organisme(r).

Overfølsomhet

Oppløsninger som inneholder glukose derivert fra hydrolysert maisstivelse, skal brukes med forsiktighet til pasienter med kjent allergi mot mais eller maisprodukter.

Overfølsomhetsreaksjoner, slik som de som skyldes allergi mot maisstivelse, inkludert anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, kan forekomme. Stopp infusjonen umiddelbart og tøm oppløsningen fra bukhulen dersom det utvikles tegn eller symptomer på en mistenkt overfølsomhetsreaksjon. Nødvendige behandlingstiltak må igangsettes dersom det er klinisk indisert.

Bruk hos pasienter med forhøyede laktatnivåer

Pasienter med forhøyede laktatnivåer bør bruke peritonealdialysevæsker som inneholder laktat med forsiktighet. Det anbefales at pasienter med tilstander som er kjent for å øke risikoen for laktacidose (f.eks. alvorlig hypotensjon, sepsis, akutt nyresvikt, medfødte feil i metabolismen, behandling med legemidler slik som metformin og nukleoside/nukleotide reverserende transkriptasehemmere (NRTIs)) kontrolleres for forekomst av laktacidose før behandlingen starter og under behandling med laktatbaserte peritonealdialysevæsker.

Generell overvåking

Ved forskrivning av dialysevæske må det for hvert enkelt tilfelle tas hensyn til mulig interaksjon mellom dialysebehandlingen og evt. behandling for andre pågående sykdommer. Serumnivåer av kalium bør overvåkes nøye hos pasienter som behandles med hjerteglykosider.

En nøyaktig fortegnelse av væskebalansen må gjøres og pasientens kroppsvekt må følges nøye for å unngå over- eller underhydrering med alvorlige konsekvenser som kongestiv hjertesvikt, volumtap og sjokk.

Proteiner, aminosyrer, vannløselige vitaminer og andre legemidler kan bli tapt under peritonealdialyse og dette kan kreve erstatningsterapi.

Elektrolyttkonsentrasjoner i serum (spesielt hydrogenkarbonat, kalium, magnesium, kalsium og fosfat), parathyreoideahormon, lipider og hematologiske parametre bør overvåkes regelmessig.

Sekundær hyperparatyroidisme

Hos pasienter med sekundær hyperparatyroidisme skal man nøye vurdere fordelene og risikoene ved bruk av en dialysevæske med 1,25 mmol/l kalsium, slik som Physioneal 40, da dette kan forverre hyperparatyroidismen

Metabolsk alkalose

Hos pasienter med hydrogenkarbonatnivå i plasma over 30 mmol/l, bør risikoen for mulig metabolsk alkalose veies opp mot fordelene ved behandling med dette preparatet.

Overinfusjon

Overinfusjon av Physioneal 40 i bukhulen kan karakteriseres av abdominal distensjon/abdominal smerte og/eller kortpustethet.

Behandling av Physioneal 40 overinfusjon er å tappe oppløsningen fra bukhulen.

Bruk av høyere glukosekonsentrasjoner

Overdreven bruk av Physioneal 40 peritonealdialysevæske med høyere glukose under peritonealdialysebehandlingen, kan føre til at for mye vann fjernes fra pasienten. Se pkt 4,9.

Tilsetning av kalium

Kalium er ikke inkludert i Physioneal 40 oppløsninger på grunn av risiko for hyperkalemi.

- I situasjoner med normalt serumnivå av kalium eller hypokalemi, kan tillegg av kaliumklorid (inntil en konsentrasjon på 4 mEq/l) være indisert for å forebygge alvorlig hypokalemi. Det bør kun initieres av en lege og etter nøye vurdering av serumkalium og total kroppskalium.

Bruk hos pasienter med diabetes

Hos pasienter med diabetes skal blodsukkernivået måles, og insulindoseringen eller annen behandling for hyperglykemi bør justeres.

Feil administrasjon

Feil rekkefølge på åpning/lukking av klemmer eller priming kan resultere i infusjon av luft i bukhulen, som kan føre til magesmerter og/eller peritonitt.

Ved infusjon av ublandet oppløsning, skal pasienten umiddelbart tømme ut oppløsningen og bruke en nylig blandet pose.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt er ikke fastsatt for pediatriske pasienter.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført

- Blodkonsentrasjonen av dialyserbare legemidler kan bli redusert under dialyse. En mulig kompensasjon for tap må tas i betraktning.
- Kaliumnivå i plasma hos pasienter som bruker hjerteglykosider må overvåkes nøye siden det er en risiko for digitalis intoksikasjon. Tilleggsbehandling med kalium kan være nødvendig.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen eller begrenset mengde data fra bruk av Physioneal 40 hos gravide kvinner. Physioneal 40 er ikke anbefalt under graviditet og til kvinner i fertil alder som ikke bruker antikonsepsjonsmiddel.

Amming

Det er ikke kjent om Physioneal 40 metabolitter utskilles i brystmelk.

Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes.

Fordelen av amming for barnet må vurderes mot fordelene av behandling for den ammende, og en avgjørelse må tas om ammingen skal avsluttes eller om den ammende skal avslutte/avstå fra Physioneal 40 behandling.

Fertilitet

Det finnes ingen kliniske data om fertilitet.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner

Pasienter i siste stadium av nyresykdom (ESRD) som behandles med peritonealdialyse kan oppleve å få bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Bivirkninger (som forekommer hos 1 % av pasientene eller flere) fra kliniske utprøvnings og etter at produktet kom på markedet, er som følger:

Bivirkningene i dette avsnittet er angitt med følgende frekvens: Svært vanlige ($\geq 1/10$); vanlige ($\geq 1/100 - < 1/10$); mindre vanlige ($\geq 1/1000 - < 1/100$); sjeldne ($> 1/10.000 - < 1/1000$); svært sjeldne ($< 1/10.000$), ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).

Organklassesystem	Foretrukket Term	Frekvens
Sykdommer i blod og lymfatiske organer	Eosinofili	Ikke kjent
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer	Alkalose Hypokalemi Væskeretensjon Hyperkalsemi Hypervolemi Anoreksia Dehydrering Hyperglykemi Laktacidose	Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig
Psykiatriske lidelser	Søvnløshet	Mindre vanlig
Nevrologiske sykdommer	Svimmelhet Hodepine	Mindre vanlig Mindre vanlig
Karsykdommer	Hypertensjon Hypotensjon	Vanlig Mindre vanlig
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum	Dyspne Hoste	Mindre vanlig Mindre vanlig
Gastrointestinale sykdommer	Peritonitt Svikt i peritonealmembranen Abdominal smerte Dyspepsi Flatulens Kvalme Innkapslende peritoneal sklerose (Sclerosing encapsulating peritonitis) Blakket dialysat	Vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Ikke kjent Ikke kjent
Hud- og underhudssykdommer	Angioødem Utslett	Ikke kjent Ikke kjent
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett	Muskel-skjelett smerter	Ikke kjent
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet	Ødem Asteni Frysninger Ansiktsødem Brokk Utilpasshet Tørste Pyreksi	Vanlig Vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Mindre vanlig Ikke kjent
Undersøkelse	Økt vekt Økt PCO ₂	Vanlig Mindre vanlig

Andre bivirkninger ved peritonealdialyse relatert til prosedyren: bakteriell peritonitt, infeksjon på kateterstedet, kateter relaterte komplikasjoner.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell

oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema

4.9 Overdosering

Mulige konsekvenser ved overdosering inkluderer hypervolemi, hypovolemi, elektrolyttforstyrrelser eller (hos diabetespasienter) hyperglykemi. Se pkt 4.4.

Behandling av overdosering

Hypervolemi kan behandles ved å bruke hypertone peritonealdialysevæsker og væskerestriksjon.

Hypovolemi kan behandles ved å bruke væskeerstatning enten oralt eller intravenøst, avhengig av dehydreringsgraden.

Elektrolyttforstyrrelser skal behandles i henhold til den aktuelle elektrolyttforstyrrelsen som bekreftes av blodprøve. Den mest sannsynlige forstyrrelsen, hypokalemi, kan behandles ved hjelp av oralt inntak av kalium eller ved tillegg av kaliumklorid i peritonealdialysevæsken foreskrevet av behandlende lege.

Hyperglykemi (hos diabetespasienter) skal behandles ved å justere insulindosen i henhold til insulinbehandling foreskrevet av behandlende lege.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Peritonealdialysevæsker, hypertone oppløsninger. ATC-kode: B05DB

Virkningsmekanisme

For pasienter med nyresvikt er peritonealdialyse en prosedyre for å fjerne toksiske substanser produsert ved nitrogen metabolisme og som normalt utskilles av nyrene, og for å hjelpe reguleringen av væske og elektrolytter i tillegg til syre/base-balansen.

Farmakodynamiske effekter

Denne prosedyren oppnås ved å administrere peritonealdialysevæske gjennom et kateter inn i bukhulen. Glukose gjør oppløsningen hyperosmolær sammenlignet med plasma, og skaper med dette en osmotisk gradient som muliggjør fjerning av væske fra plasma til oppløsningen. Overføring av substanser mellom pasientens peritoneale kapillærseng og dialysevæsken gjøres gjennom den peritoneale membran i henhold til prinsippene om osmose og diffusjon. Etter dialysetiden er væsken mettet med toksiske substanser og må skiftes. Med unntak av laktat, som er til stede som en forløper for hydrogenkarbonat, er elektrolyttkonsentrasjonene i væsken valgt for å normalisere elektrolyttkonsentrasjoner i plasma. Nitrose avfallsprodukter, til stede i høy konsentrasjon i blodet, passerer den peritoneale membranen og inn i dialysevæsken.

Klinisk effekt og sikkerhet

Mer enn 30 % av pasientene i de kliniske studiene var eldre enn 65 år. Evalueringen av resultatene fra denne gruppen viser ingen forskjell sammenlignet med de andre pasientene.

In vitro og ex vivo studier har vist forbedrede biokompatibilitetsindikatorer for Physioneal 40 sammenlignet med standard laktatbuffer oppløsning. I tillegg har kliniske studier med et begrenset antall pasienter med abdominale smerter ved fylling av væske, bekreftet en viss symptomatisk fordel. Hittil finnes det imidlertid ingen data som indikerer at kliniske komplikasjoner generelt reduseres eller at jevnlig bruk av slike oppløsninger kan overføres til meningsfulle fordeler over lengre tid.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Intraperitonealt administrert glukose, elektrolytter og vann absorberes inn i blodet og metaboliseres på vanlig måte.

Glukose metaboliseres (1 g glukose = 4 kilokalorier eller 17 kilojoule) til CO₂ og H₂O.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Ingen ikke-kliniske studier er utført med Physioneal 40.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpstoffer

Vann til injeksjonsvæsker

Karbondioksid (justering av pH)

6.2 Uforlikeligheter

Dette preparatet skal ikke blandes med andre legemidler, unntatt kompatible legemidler, se pkt. 6.6.

6.3 Holdbarhet

- Holdbarhet i salgspakning:

2 år.

- Holdbarhet etter blanding:

Produktet skal, når ytterposen er fjernet og blanding er utført, brukes innen 24 timer.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Skal ikke oppbevares under 4°C.

Oppbevares i originalpakningen.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Physioneal 40 oppløsningen er hermetisk forseglet inne i en pose med to kamre, produsert av PVC av medisinsk kvalitet.

Det øvre kammeret er utstyrt med en injeksjonsport for tilsetning av legemidler til oppløsningen med glukose og elektrolytter. Det nedre kammeret er utstyrt med en port for tilkobling til et passende administrasjonssett for dialysebruk.

Posen er, ved hjelp av varme, forseglet inne i en gjennomsiktig ytterpose laget av flerlags kopolymerer.

Posevolum etter rekonstituering: 1500 ml (544 ml av oppløsning A og 956 ml av oppløsning B), 2000 ml (725 ml av oppløsning A og 1275 ml av oppløsning B), 2500 ml (906 ml av oppløsning A og 1594 ml av oppløsning B).

Standardposen er en tokammerpose (lite kammer "A" og stort kammer "B", se avsnitt 2) for bruk i Automated Peritoneal Dialysis (APD).

Duoposen er en tokammerpose (lite kammer "A" og stort kammer "B", se avsnitt 2) med et integrert frakoblingssystem samt en tom drenasjepose for bruk i Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført:

<u>Posevolum</u>	<u>Enheter pr. kartong</u>	<u>Standard/DUO</u>	<u>Koblingstype</u>
1500 ml	5	Standard tokammerpose	Skru
1500 ml	6	Standard tokammerpose	Skru

1500 ml	5	Duo tokammerpose	Skr
1500 ml	6	Duo tokammerpose	Skr
2000 ml	4	Standard tokammerpose	Skr
2000 ml	5	Standard tokammerpose	Skr
2000 ml	4	Duo tokammerpose	Skr
2000 ml	5	Duo tokammerpose	Skr
2500 ml	4	Standard tokammerpose	Skr
2500 ml	5	Standard tokammerpose	Skr
2500 ml	4	Duo tokammerpose	Skr
2500 ml	5	Duo tokammerpose	Skr

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

For detaljer angående administrering, se pkt 4.2.

- Detaljert instruksjon om prosedyren for peritonealdialyse skift, blir gitt til pasienter ved hjelp av trening i et spesialisert treningssenter, før bruk i hjemmet.
- Etter at ytterposen er fjernet, bryt straks forseglingen (brekkstiften) mellom kamrene for å blande de to væskene. Vent inntil det øvre kammeret er tømt fullstendig i det nedre kammeret. Bland forsiktig ved å trykke med begge hender på det nedre kammerets vegger. Oppløsningen til intraperitoneal bruk må infunderes innen 24 timer etter blanding. Se pkt 4.2.
- Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist for 6 timer ved 25 °C for insulin (Actrapid, 10 IU/l, 20 IU/l og 40 IU/l).
- Aminoglykosider bør ikke administreres med penicillin i samme pose, på grunn av kjemisk uforlikelighet.
- Legemidler skal tilsettes gjennom medikamentporten på det store kammeret før man bryter forseglingen (brekkstiften) mellom kamrene. Legemiddelkompatibilitet må kontrolleres før tilsetning, og pH og oppløsningens salter må tas i betraktning. Preparatet bør brukes umiddelbart etter eventuell tilsetning av legemiddel.
- Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
- Dersom beholderen er skadet skal den kasseres.
- Oppløsningen er uten bakterielle endotoksiner.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vantive AB
Box 63
SE-164 94 Kista
Sverige

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSENS NUMMER (NUMRE)

99-3095 Physioneal 40 Glucose 13,6 mg/ml
99-3096 Physioneal 40 Glucose 22,7 mg/ml

99-3097 Physioneal 40 Glucose 38,6 mg/ml

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

09.10.2000/ 28.03.2008

10. OPPDATERINGSDATO

21.08.2024